



**TLV**

---

TANDVÅRDS- OCH

---

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET

---


# Omprövning av TNF-hämmare

December 2011

# Bakgrund

- Omprövning av TNF-hämmarna Enbrel, Humira och Remicade i förhållande till Simponi och Cimzia
- Indikationer: reumatoid artrit, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit.
- Total behandlingsskostnad senaste 12 månaderna: 2,2 miljarder kronor
- Omprövningen sammanfaller i tiden med Socialstyrelsens nya riktlinjer
- Kostnadsökning om fullt genomslag av nya riktlinjer: över 500 miljoner kronor per år (25%)

# Försäljning TNF-hämmare 2007-2010



# TLV:s bedömning

- På gruppnivå förefaller det inte vara några skillnader mellan de fem i Sverige tillgängliga TNF-hämmarna avseende behandlingseffekt vid de aktuella indikationerna
- Direkt jämförande studier saknas, indirekta jämförelser visar inte på statistiskt säkerställda skillnader.
- Bedömningen går i linje med gällande rekommendationer (ACR, EULAR, SRF, SoS) och stöds av Läkemedelsverket, SBU och Socialstyrelsen.

# TLV:s bedömning forts.

## **TLV skall ta beslut enligt tre principer:**

- Människovärdesprincipen
  - Behovs och solidaritetsprincipen
  - Kostnadseffektivitetsprincipen.
- 
- Då TLV:s bedömning är att TNF-hämmarna är likvärdiga avseende behandlingseffekt på gruppnivå så blir kostnadseffektivitetsprincipen avgörande.
  - Kostnadseffektivitetsprincipen säger att vid likvärdig behandlingseffekt är det läkemedel kostnadseffektivt som har den lägsta behandlingskosten.

# TLV:s beslut med motivering

**Enbrel och Humira** kvarstår inom förmånen utan begränsning eftersom priserna sänkts så de ligger i nivå med Simponi och Cimzia. (Årskostnad fr.o.m. jan 2012 cirka 136 000 kr/pat)

**Remicade** kvarstår inom förmånen utan begränsning. Remicade i dosen  $\leq 300$  mg kostar mindre än övriga TNF-hämmare. TLV finner det styrkt att den huvudsakliga användningen ligger  $\leq 300$  mg.

# Landstingen är vår förlängda arm!

- Ta alltid hänsyn till kostnaden när behandling med TNF-hämmare inleds
- Remicade är endast kostnadseffektivt med en dos upp till 3x100 mg. Vi högre doser bör andra TNF-hämmare väljas.